




Varici


Le varici degli arti inferiori vengono trattate in ambito ambulatoriale e mininvasivo.

Inizialmente si procede ad una valutazione ambulatoriale da parte del Chirurgo Vascolare ed a contestuale studio Ecocolordoppler mirato a definire la tecnica chirurgica specifica.

I principali trattamenti proposti sono:

- Trattamento endovascolare della safena con **Termoablazione con Radiofrequenza** (foto) in anestesia locale per tumescenza





Viene eseguita la oblitterazione endovascolare della safena patologica senza incisione chirurgica inguinale e con accesso percutaneo ecodoppler guidato. Si associano solitamente le flebectomie asportando con piccole incisioni cutanee le vene varicose periferiche tributarie

- **Flebectomie** (asportazione con piccole incisioni cutanee delle varici periferiche) e **perforantectomie** in anestesia locale o locoregionale per il trattamento delle varici extrasfeniche e delle varici recidive associando in un secondo tempo in casi selezionati trattamento sclerosante

- trattamenti emodinamici - conservativi delle safene - **ASVAL e CHIVA** - asportando con microincisioni in anestesia locale solo le varici periferiche utilizzando dei piccoli uncini di Mueller

- in casi selezionati **crosssectomia** safeno femorali e safeno poplitee associate a flebectomie

Viene sempre eseguito un esame **ecocolordoppler** in visita vascolare ed una cartografia venosa sotto controllo ecodoppler al ricovero .

Le metodiche ambulatoriali mininvasive permettono un trattamento ambulatoriale, un recupero più rapido, meno dolore ed effetti collaterali, miglior risultato estetico e funzionale.