



Congregazione
Suore Misericordine di S. Gerardo
Monza
CASA DI CURA LECCO
"Beato Luigi Talamoni"
Via San Nicolò, 12 - 23900 Lecco
Tel: 0341274111 Fax: 0341284033
sito: www.casadicuratalamoni.it
email: direzione@casadicuratalamoni.it



ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DELLE FECI

ESAME COPROPARASSITOLOGICO

| | |
|----------------------|---|
| CONTENITORE | <p>Provetta da ritirare in laboratorio, contenente una soluzione fissativa per la preservazione del campione fecale e di eventuali parassiti. NB: La soluzione fissativa contenuta nel contenitore è VELENOSA. NON BERE, TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.</p> <ul style="list-style-type: none">• In caso di contatto con la pelle o con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua corrente e contattare il medico in caso di irritazione.• In caso di ingestione accidentale, diluire bevendo 2-4 bicchieri d'acqua e contattare immediatamente un medico, rivolgendosi ad un pronto soccorso o ad un centro antiveleni. |
| MODALITA' | <ul style="list-style-type: none">• Raccogliere le feci in una padella o in una pellicola trasparente, evitando contaminazioni con urina o acqua.• Trasferire mediante la spatola fornita, una parte del campione fecale nel contenitore apposito.• Qualora la prescrizione del medico preveda la raccolta di più campioni, gli stessi possono essere consegnati tutti contemporaneamente in un'unica data.• Consegnare unitamente al campione anche il questionario allegato al presente foglio, compilato in ogni sua parte. |
| CONSERVAZIONE | <p>Il campione può essere conservato a temperatura ambiente fino alla consegna dello stesso.</p> |
| OSSERVAZIONI | <ul style="list-style-type: none">• Alcuni giorni prima e durante il periodo della raccolta delle feci non fare uso di lassativi, antidiarroici, antimicrobici, o di altre sostanze interferenti come bario, bismuto, oli minerali.• Alcuni giorni prima e durante il periodo della raccolta delle feci si consiglia di seguire un regime dietetico che prevede di evitare: legumi e frutta secca, frutti e verdure a cuticola resistente (pesche, albicocche, pomodori, pere, fragole, fichi), carote e banane. <p>Consegnare il contenitore in Laboratorio entro le ore 10.00.</p> |



DOSAGGIO CALPROTECTINA NELLE FECI

| | |
|----------------------|--|
| CONTENITORE | Contenitore di plastica con tappo a vite. |
| MODALITA' | <ul style="list-style-type: none">Raccogliere le feci in un contenitore pulito ed asciutto, evitando contaminazioni con urina o acquaTenendo il tubo in posizione verticale, trasferire un piccolo quantitativo (circa una noce) di materiale fecale mediante l'utilizzo di una spatola pulita Non sono idonei campioni di feci liquide. |
| CONSERVAZIONE | Conservare il contenitore con le feci in frigorifero per non più di 48 ore. Se tenute a temperatura ambiente devono essere consegnate entro 1 ora in Laboratorio. |
| OSSERVAZIONI | Consegnare il contenitore in Laboratorio entro le ore 10.00 . |

ANTIGENE HELICOBACTER PYLORI NELLE FECI

| | |
|----------------------|--|
| CONTENITORE | Contenitore di plastica con tappo a vite |
| MODALITA' | <ul style="list-style-type: none">Raccogliere le feci in un contenitore pulito ed asciutto, evitando contaminazioni con urina o acquaTenendo il tubo in posizione verticale, trasferire un piccolo quantitativo di materiale fecale mediante l'utilizzo di una spatola pulita |
| CONSERVAZIONE | Il campione può essere conservato in frigorifero per un massimo di 24 ore. |
| OSSERVAZIONI | Consegnare il contenitore in Laboratorio entro le ore 10.00 . |

COPROCOLTURA

| | |
|----------------------|--|
| CONTENITORE | Contenitore di plastica con tappo a vite |
| MODALITA' | <ul style="list-style-type: none">Raccogliere le feci in un contenitore pulito ed asciutto, evitando contaminazioni con urina o acquaTenendo il tubo in posizione verticale, trasferire un piccolo quantitativo di materiale fecale mediante l'utilizzo di una spatola pulita |
| CONSERVAZIONE | Il campione se possibile va consegnato in Laboratorio nel più breve tempo possibile dopo la raccolta (entro 2 ore), altrimenti è possibile conservarlo al massimo per 12 ore in frigorifero. |
| OSSERVAZIONI | Consegnare il contenitore in Laboratorio entro le ore 10.00 . |